기상청


3개월전망


(강원도 영서 2026년 12월 ~ 2027년 2월)

2026년 11월 23일 11시 발표

※ 다음 3개월 전망은 2026년 12월 23일 11시 발표

※ 기압계 변화 시 수정 전망이 발표될 수 있고, 매주 목요일 발표되는 1개월 전망 등 최신 전망을 참고하시기 바랍니다.





※평년범위는 과거 30년(1991-2020년)간 연도별 30개의 평균값 중 대략적으로 33.33%~66.67%에 해당하는 값

〈확률별 해석〉

확률(낮음(적음) : 비슷 : 높음(많음))	해설
높음(많음) 확률이 50%이상	평년보다 높겠음(많겠음)
(20:40:40)	평년보다 대체로 높겠음(많겠음)
비슷확률이 50%이상 또는 (30:40:30)	평년과 비슷하겠음
(40:40:20)	평년보다 대체로 낮겠음(적겠음)
낮음(적음) 확률이 50%이상	평년보다 낮겠음(적겠음)

■ 전망 요약

○ **기온 전망:** 12월, 2월은 평년보다 높겠습니다. (확률전망(%): 낮음 10, 비슷 40, 높음 50)
1월은 평년보다 대체로 높겠습니다. (확률전망(%): 낮음 20, 비슷 40, 높음 40)

○ **강수량 전망:** 12월, 2월은 평년보다 대체로 많겠습니다. (확률전망(%): 적음 20, 비슷 40, 많음 40)
1월은 평년과 비슷하겠습니다. (확률전망(%): 적음 20, 비슷 50, 많음 30)

○ **엘니뇨/라니냐 전망:** 엘니뇨·라니냐 감시구역의 해수면 온도는 평년보다 높은 엘니뇨 상태이며, 10월 월평균 및 3개월(9월, 8~10월 평균) 이동평균한 해수면 온도 편차는 각각 해당 기간의 역대 1위를 기록하였습니다.
※ 엘니뇨·라니냐 감시구역 해수면 온도 편차 현황:
(월평균) 10월 +2.6℃, (3개월 이동평균) 9월(8~10월 평균) +2.4℃

12월~2월 동안 해수면 온도가 평년보다 높은 상태로 유지되어 강한 엘니뇨(해수면 온도 편차 +1.5℃ 이상)가 지속될 가능성이 높으며, 12월에 엘니뇨의 최성기가 될 것으로 예상됩니다.

※ 다음 3개월전망은 2026년 12월 23일 발표됩니다.

■ 월별 전망

기간	월별 전망
12월	엘니뇨의 영향으로 열대 서태평양의 대류 활동이 감소하여 우리나라 동쪽에 고기압성 순환이 강화되고 온난 습윤한 공기가 유입되어 평년보다 기온이 높겠고 강수량은 대체로 많겠습니다. (월평균기온) 평년(-3.3~-1.9℃)보다 높을 확률이 50%입니다. (월강수량) 평년(15.1~22.2㎜)과 비슷하거나 많을 확률이 각각 40%입니다.
1월	엘니뇨의 영향으로 열대 서태평양의 대류 활동이 감소하여 우리나라 동쪽에 고기압성 순환이 강화되고 온난 습윤한 공기가 유입되어 평년보다 기온이 대체로 높겠습니다. 바렌츠-카라해의 적은 해빙 영향으로 일시적으로 찬 공기가 유입되어 기온 변동성이 크겠습니다. (월평균기온) 평년(-5.7~-4.1℃)과 비슷하거나 높을 확률이 각각 40%입니다. (월강수량) 평년(12.0~26.5㎜)과 비슷할 확률이 50%입니다.
2월	엘니뇨의 영향으로 열대 서태평양의 대류 활동이 감소하여 우리나라 동쪽에 고기압성 순환이 강화되고 온난 습윤한 공기가 유입되어 평년보다 기온이 높겠고 강수량은 대체로 많겠습니다. (월평균기온) 평년(-2.6~-1.2℃)보다 높을 확률이 50%입니다. (월강수량) 평년(18.0~43.7㎜)과 비슷하거나 많을 확률이 각각 40%입니다.